

Prévention des infections nosocomiales

Indicateurs nationaux et institutionnels


Sandra Fournier, Catherine Monteil, Vincent Jarlier, Christian Richard
EOH / DOMU/ CLIN central

Prévention des infections du site opératoire

Indicateur ICA-LISO


Comment faire mieux :

- Appliquer la **check list** dans **tous** les blocs
- Surveiller les ISO et calculer des **taux d'infection** dans tous les services
- Évaluer la **préparation cutanée** de l'opéré.
- Évaluer l'**antibioprophylaxie**.



Grippe nosocomiale 13 épidémies en 2015


Vaccination antigrippale des patients en SLD



Vaccination antigrippale des personnels médicaux


Source médecine du travail
Moyenne 26%

Sous-estimation probable: certains médecins se vaccinent eux-mêmes




Bactéries hautement résistantes émergentes

Proportion d'épidémies stable malgré l'augmentation des épisodes



Moins d'épidémies à l'AP-HP que dans les autres hôpitaux français



- 75% des patients ont un lien avec l'étranger
- Mesures d'autant plus efficaces qu'elles sont appliquées tôt
- Coût d'une épidémie >>> porteur unique
- Intérêt des secteurs identifiés en MCO et SSR pour:
 - Diminuer le risque épidémique
 - Assurer l'aval de la réa en MCO et du MCO en SSR


Hygiène des mains Friction hydro alcoolique

LA mesure essentielle de prévention des infections nosocomiales:

- prévenir la transmission croisée des microorganismes
- limiter l'infection des dispositifs invasifs

→ Réaliser une friction hydro alcoolique avant et après chaque contact avec un patient

En 2015, pour 2 frictions nécessaires, une seule est réalisée



Synthèse

- 1. Chirurgie : appliquer la check list, surveiller les ISO**
- 2. Renforcer la vaccination anti grippale des personnels**
- 3. Identifier des secteurs pour regrouper les patients porteurs de BHRe dans chaque GH**
- 4. Renforcer l'hygiène des mains par la friction hydro-alcoolique**
- 5. Mettre en œuvre le plan Antibiotiques**